



Schmerz-Stopp-Gel

Medizinprodukt

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten müssen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

SOS Schmerz-Stopp-Gel ist eine Akuthilfe zur schnellen Linderung von Muskel-, Gelenk- und posttraumatischen Schmerzen. Das Gel wird direkt auf die schmerzende Stelle aufgetragen und wirkt zunächst kühlend und anschließend wohltuend wärmend. Dank des integrierten Applikators lässt sich das Gel leicht auftragen, während die Handinnenflächen sauber bleiben, was eine Anwendung unterwegs erleichtert. Gleichzeitig bietet die 3-Ball-Technik einen angenehmen Massageeffekt.

SOS Schmerz-Stopp-Gel ist wirksamer als ein Gel auf Ibuprofen-Basis (5%)* und für Erwachsene und Kinder ab 7 Jahren geeignet.

* Die Wirksamkeit wurde wissenschaftlich nachgewiesen (In-vivo-Studie 12POGAD02, November 2013).

Anwendungsgebiet:

Linderung bei Muskel-, Gelenk- und posttraumatischen Schmerzen.

SOS Schmerz-Stopp-Gel hemmt auch die Bildung von Ödemen. Die Anwendung ist daher geeignet bei Verspannungen, Verstauchungen, Verdrehungen, Zerrungen, Überdehnungen, Muskelfaserrissen und diversen Traumata.

Zusammensetzung:

Aqua; Alcohol; PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol

Ether; Menthol; Mentha Piperita Oil; Aqua, Propylene Glycol, Equisetum Arvense Extract; Aqua, Propylene Glycol, Harpagophytum Procumbens Root Extract; Camphor; Illite; Carbomer; Rosmarinus Officinalis Leaf Oil; Melaleuca Leucadendron Cajaputi Oil; Thymus Vulgaris Flower/Leaf Oil; Sodium Hydroxide; CI 42090

Anwendung:

Erwachsene und Kinder ab 7 Jahren. Drücken Sie leicht die Tube. Tragen Sie das Gel mit Rotationsbewegungen auf den schmerzenden Bereich auf, indem Sie es mit dem speziellen Massage-Applikator 3- bis 4-mal täglich leicht einmassieren. Gegebenenfalls nach Gebrauch Hände waschen. Das Gel nach Gebrauch wieder gut verschließen.

Hinweis:

Das Kalt-Warm-Empfinden wird je nach Anwender unterschiedlich wahrgenommen.

Warnhinweise:

Nur zur äußerlichen Anwendung. Nicht bei Kindern unter 7 Jahren anwenden. Nicht während der Schwangerschaft oder der Stillzeit anwenden. Personen, die schon unter Krampfanfällen oder epileptischen Anfällen gelitten haben, müssen vor Anwendung ihren behandelnden Arzt konsultieren. Kontakt mit den Augen und/oder Schleimhäuten vermeiden. Nicht auf offene Wunden oder auf verletzte oder gereizte Haut auftragen. Einige Inhaltsstoffe können allergische Reaktionen hervorrufen. Wenn eine Reizung auftritt oder andere Anzeichen einer Überempfindlichkeit auftreten, beenden Sie die Behandlung sofort. Nicht unter einem Okklusivpflaster anwenden.



Nicht in Verbindung mit anderen Cremes, Balsamen, Einreibemitteln, Sprays oder Massageölen verwenden.

Nicht zusammen mit wärmespendenden Vorrichtungen anwenden. Im Falle einer versehentlichen Einnahme ist ein Arzt, Apotheker oder eine Giftinformationszentrale zu konsultieren.

Falls die Schmerzen länger als 5 Tage anhalten oder falls es nach dem Auftragen zu Hautreizungen kommt, ist die Anwendung des Gels abzusetzen und fachlicher Rat einzuholen.

Nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums nicht mehr anzuwenden.

Vor Kindern sicher aufbewahren.

Inhalt: 50 ml



Hersteller:

Laboratoire Polidis
8 Rue des Goncourt
75011 Paris
France



Vertrieb:

DISTRICON GmbH
Am Joseph 15,
D-61273 Wehrheim

Stand der Information: 2018.12

Bedeutung der Symbole auf Packung:



Hersteller



Temperaturbegrenzung



Vor Sonnenlicht schützen



Trocken lagern



Bei beschädigter Verpackung
nicht verwenden



Haltbarkeit nach Anbruch
in Monaten



Chargenbezeichnung



Verwendbar bis

